

Desinfizierendes Einstreumittel



Dokumentierte Qualitätshygiene

Das wissenschaftlich formulierte Pulver ist sicher im Gebrauch und leicht anzuwenden. Basic® verbessert die unmittelbare Umgebung der Tiere, indem es schädliche Pathogene austrocknet und hemmt. Basic® reduziert Feuchtigkeit und potenziell gefährliche Gase wie Ammoniak. Bei regelmäßigem Gebrauch beugt Basic® Krankheiten vor und sichert ein besseres Milieu für gesündere Tiere.

- Super Qualität zum Discountpreis
- Basic® ist wissenschaftlich geprüft
- Hemmt das Schlüpfen von Fliegenlarven
- Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen
- Absorbiert gut – kräftig austrocknend
- Verklumpt nicht auf Lager
- Gute Bindung von Ammoniak
- Geeignet für alle Arten von Tierhaltung und Stallsystemen
- Verbessert das Stallmilieu
- Reduziert den Geruch von Ammoniak
- Erfrischt den Stall

Beschreibung:

Basic® besteht aus verschiedenen besonders ausgewählten Rohmaterialien. Darunter Mineralien, Pflanzenteile und ein desinfizierender Aktivstoff. Basic® wird zur Verbesserung der sanitären Verhältnisse innerhalb aller Arten von Tierhaltung und allen Stallsystemen verwendet. Basic® kann manuell oder maschinell ausgelegt werden, oder mit anderer Streu vor der Zuteilung vermischt werden.

Verwendung:

Basic® kann für alle Tierarten und alle Stallsysteme zum Austrocknen, senken des Krankheitsdrucks und einem verbesserten Wohlergehen der Tiere verwendet werden.



Dokumentierte Wirkung gegen:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tel.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk



Desinfizierendes Einstreumittel



Gebrauchsanweisung

Basic® - Liegeboxen

Basic® wird 2-3 Mal pro Woche, entsprechend 125 g (eine große Hand voll) pro Liegebox verteilt. Basic® kann im hinteren Bereich der Liegefläche und auch in der Mitte verwendet werden. Basic® wird auf dem Boden, als auch auf der Oberfläche der Liegefläche (auf der gewöhnlichen Einstreu) ausgestreut, um ein trockenes Milieu zu sichern.

Im Fall von Problemen mit Milchverlusten, oder unter besonders feuchten Verhältnissen, bei Krankheitsausbruch, oder bei erhöhtem Krankheitsdruck, sollte Basic® täglich verwendet werden, bis der Krankheitsdruck sich wieder normalisiert hat. Anschließend kann Basic® wieder 2-3 Mal pro Woche verteilt werden.

Basic® - Kälberbox und Kälberhütten

Basic® wird 1-2 Mal pro Woche, entsprechend 75-100 g (eine gute Hand voll) auf der Einstreu verteilt. Die besten Ergebnisse werden erreicht, wenn man Basic® kontinuierlich verwendet. Dadurch wird eine Reduktion des Krankheitsdrucks erreicht. Bei Ausbruch von Durchfall o.ä. sollte Basic® täglich, entsprechend 125 g (eine große Hand voll) pro m² auf der Einstreu ausgestreut werden.

Basic® - Anbindestall und Tiefstreustall

Basic® sollte mit einer Menge von 50-75 g (eine Hand voll) pro m² Fläche auf der Einstreu verteilt werden.



Dokumentierte Wirkung gegen:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobacter Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tel.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk

