

Desinficerende Hygiejnemiddel



BASIC

Dokumenteret kvalitetshygiejne

Det videnskabeligt formulerede pulver er sikkert at bruge, let at anvende og har til formål at forbedre dyrenes nærmiljø ved at udtørre og hæmme skadelige patogener. Basic® Hygiejnemiddel reducerer fugt og potentielt farlige skadelige gasser som ammoniak. Brug Basic® Hygiejnemiddel regelmæssigt for at forebygge sygdomme og for at sikre et bedre miljø for sundere dyr.

- **Super kvalitet til discountpris**
- **Basic® har dokumenteret effekt**
- **Reducerer udklækningssteder for fluer**
- **Hæmmer vækst af mikroorganismer**
- **God absorbering - stærkt udtørrende**
- **Klumper ikke på lager**
- **God ammoniakbinding**
- **Velegnet til alle typer dyrehold og staldsystemer**
- **Forbedrer staldmiljøet**
- **Reducerer lugtgener fra ammoniak**
- **Frisker stalden op**

Basic® Hygiejnemiddel er et tørdesinfektionsmiddel, der kan anvendes uden at flytte dyrene. Det er sammensat af nøje udvalgte materialer, herunder mineraler, plantedele og desinficerende aktivstof.

Basic® Hygiejnemiddel anvendes til udtørring, forbedring af sanitære forhold, sænkning af smittepres og øget velvære for dyrene i alle typer dyrehold og staldsystemer.



Dokumenteret effekt mod:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tlf.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk



god staldhygiejne skaber resultater

Desinficerende Hygiejnemiddel



BASIC

Brugsanvisning

Basic® Hygiejnemiddel til får og geder

Basic® er et oplagt valg at bruge for at sikre et tørt nærmiljø i læmmeboksen, dybstrøelsesstalden m.m. Basic® kan udlægges manuelt, med maskine eller blandes med øvrig strøelse før udlægning.

Basic® bør fordeles med en mængde på 60-85 g pr. m² dækflade på gulvarealet i hele læmmeboksen. Herefter strøs der med den almindelige strøelse som f.eks. halm, for så til sidst igen at tildele Basic® i samme mængdeforhold. Basic® er med til at eliminere udklækningsstederne for flueæg og fluelarver, da Basic® har en god absorberingsevne og dermed virker stærkt udtørrende.

Basic® bør bruges dagligt de første 3 dage efter udmugning og herefter stabilt 2-3 gange om ugen. Ved konsekvent brug af Basic® minimum 2-3 gange ugentligt, sikres et tørt miljø, ammoniak bindes og fugt absorberes.

I tilfælde af udfordringer med forhøjet smittepres eller ved særligt fugtige forhold i stalden, bør forbruget af Basic® øges til en mængde af 75-100 g pr. m² dækflade. Forbruget af Basic® bør fortsætte i dette niveau, indtil forholdene igen er tilbage til deres normale udgangspunkt.



Dokumenteret effekt mod:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tlf.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk




god staldhygiejne skaber resultater