



Grise

*"Lad os gøre det,
vi er bedst til...
sammen"*



HVORFOR VÆLGE DESTEK?



RÅDGIVNING TEAM DESTEK

Vi er langt mere end salg, for vi brænder også for den faglige rådgivning inden for hygiejne, toksinbindere og fodersyre. Vores store erfaring i branchen, gør os velforberedte på de mange udfordringer i stalden. Kontakt din konsulent, hvis du har spørgsmål til produkter eller ønsker kompetent sparring.

VIDENSDELING KURSER

Vi tilbyder hygiejnekurser til dig, dine medarbejdere, erfa-grupper og lignende. Ønsker du et ekstra fokus på staldhygiejne, fodersyrer eller toksiner, tilbyder vi kurser på dansk, engelsk og tysk. Vi sætter fokus på rutiner, management, brug af produkter ... og vi klæder jer godt på fagligt.

KVALITET HØJ STANDARD

Når du handler med os, er du sikret god kvalitet. Vi producerer efter de strengeste standarder, og stiller omfattende krav til samtlige leverandører og samarbejdspartnere.

TEST ANALYSER

ATP-test og måling giver visuel forståelse af renligheden – både før og efter vask og desinficering. Vandanalyser sikrer helheden af den bedste staldhygiejne, og vi tester blandt andet for E. Coli, enterokokker, skimmelsvamp, mikrosvampe og gær.

CARE •



Staldsæber Udvalg	4
Staldsæbe DeterUltra®	5
Doseringsvogn Kemi	5
Desinfektion Udvalg	6
Desinfektion Envicoc Forte	7
Vanddesinfektion Lerasept® Spezial	8
Vanddesinfektion Oxisal	9
Vandanalyse Laboratorie	9
Tørdesinfektion Basic®	10 – 11
Anbefalinger FiberCombi®	12
Udtørringsmiddel Fibercombi®	13
Toksinbinder ToxiTop	14 – 15
Fodersyre Anvendelse	16
Fodersyre Standardprogram	17
Fodersyre MPE+	18
Fodersyre Vitaly	19

**GOD
VASKEKRAFT**



DT STALDRENS GEL

Et traditionelt alkalisk skummende rengøringsmiddel med god vaskekraft. Giver med den skummede effekt en synlig udlægning.

Dosering: 1–3 %

Dunk: 30 kg / Tromle 210 kg

DT VÅDFODERSÆBE

Et kraftigt alkalisk rengøringsmiddel til vådfoderanlæg og vådfodertank. For at opnå den bedste foderoptagelse og foderudnyttelse er det vigtigt at sørge for et højt hygiejneniveau både i fodersiloer og foderkøkkener. Det giver sunde og raske dyr.

Sæben opløser fedt og proteiner, så biofilm nedbrydes effektivt. Fyld blandetanken med 200–400 liter

vand, og tilsæt 3–5 % af den samlede vandmængde. Lad opløsningen cirkulere i anlægget i op til 3 timer.

Dosering: 3–5 %

Dunk: 30 kg / Tromle 210 kg

DT SOVASK

En skånsom og meget mild sæbe, der ikke udtørre dyrenes hud – biologisk nedbrydelig. Snavsede dyr, der indsættes i ren stald, medbringer en større mængde af uønskede bakterier. I henhold til bekendtgørelse om beskyttelse af grise, kapitel 5, §24, skal drægtige søer og gylte gøres rene, inden de anbringes i farestien. Der er krydsoverensstemmelse på denne regel.

Dosering: 1–3 %

Dunk: 30 kg

NY TEKNOLOGI VASKEKRAFT DER FLYTTER GRÆNSER!

**RÅ OG
STÆRK
VASKEKRAFT**



DETERULTRA®

Førsteklasses premium skumrens med høj skumdensitet. Sæben er kompleks og specielt udviklet til at give høj alkalinitet.

Med en fremragende vaskekraft trænger sæben hurtigt ind og løsner og fjerner selv kraftigt organisk snavs fra overflader og udstyr. Ved indsæbning af større arealer sikrer det kraftige skum mod for hurtig indtørring.

Dosering: 2-4 %

Dunk: 21,6 kg

Tromle: 216 kg

DOSERINGSVOGN TIL HØJTRYK

Mobil doseringsvogn i holdbart rustfrit stål – ingen tunge løft samt sikker dosering.

Doseringsvognen kobles direkte til det eksisterende højtrykssystem. Princippet bygger på, at der er gjort plads til to dunke med kemi. Via trevejshanen skiftes der mellem vask med rent vand eller valg af to slags kemi, for eksempel staldsæbe og stalddesinfektion.

Doseringsvognen giver god mulighed for at justere mellem de forskellige ønskede doseringer, hvorved den rette koncentration af produktet sikres.





DT GLUTASAN

Kraftigt virkende glutaraldehyd – anvendes til overfladedesinfektion i tomme stalde, lagerbygninger, transportbiler med mere. Yderst bredspektret desinfektionsmiddel med dræbende effekt over for bakterier, svampe, sporer og virus helt ned til 5 °C. Effektiv ved både varm- og koldtågedesinfektion samt overfladedesinfektion.

Dosering: 0,5–2 %

Dunk: 30 kg / Tromle 220 kg



DT GLUTASAN PROCID

Baseret på den nye generation af glutaraldehydprodukter, hvor de farligste komponenter er reduceret væsentligt til fordel for nye og særdeles virksomme hjælpe- og aktivstoffer. Anvendes til overfladedesinfektion af stalde, lagerbygninger, transportbiler og udstyr til husdyrproduktion. Effektiv ned til 4 °C.

Dosering: 0,5–2 %

Dunk: 30 kg / Tromle 210 kg



LERASEPT® SPEZIAL

Hurtigvirkende oxiderende desinfektion – yderst bredspektret, alsidigt og kraftigt virkende desinfektionsmiddel. Baseret på eddikesyre, pereddikesyre og hydrogenperoxid. Kort indvirkningstid og virker selv ved lave temperaturer. Er godkendt til både overfladedesinfektion og rørdesinfektion. Effektiv virkning mod bakterier, virus, svampe og sporer.

Læs mere på side 8.

Dosering: 0,5–2,5 % (overflader)

Dunk: 23 kg / Tromle 210 kg



OXISAL

Meget kraftig hydrogenperoxidopløsning, der primært bruges til desinfektion af vandrør. Den kraftige oxidation løsriver og opløser selv de mest genstridige biobelægnin-
ger. Virker ned til 5 °C.

Læs mere på side 9.

Dosering uden dyr: 1–2 % afhængig af tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed.

Dosering med dyr: Tilsæt til rørsystemet med 0,01–0,02 %.

Dunk: 24 kg



EFFEKT DK FOG

Anbefales som svævemiddel, når der benyttes tågeaggregat i forbindelse med desinfektionsopgaver i grisebesætninger. Forstærker bæreevne og desinfektionstid svarende til et partikelfald på 0,5 meter / time.

Dosering: Min. 10 % af færdig desinfektionsopløsning.

Dunk: 30 kg / Tromle 220 kg

ENVICOC FORTE

Anvendes til kraftig og bredspektret desinfektion. Sammensætningen er udviklet, dokumenteret og godkendt til at bekæmpe coccidier, ormeæg, cryptosporidier, bakterier, vira, svampe og meget mere.

Nulstil smittetrykket

Bakterier
Vira
Svampe
Sporer

COCCIDIER / ORM / ÆG / LARVER:

Dosering: 2 % / ved 18–22 °C
Indvirkningstid: 120 minutter

VIRA:

Dosering: 2 %
Indvirkningstid: 60 minutter

MYKOBAKTERIER:

Dosering: 1 %
Indvirkningstid: 60 minutter

BAKTERIER OG GÆRARTER:

Dosering: 0,75 %
Indvirkningstid: 30 minutter

INTENSIV
OG EFFEKTIV

Coccidier

Cryptosporidier

Ormeæg

Rundorm

Rundormeæg



DESINFEKTION AF RØRSYSTEMER

LERASEPT® SPEZIAL

Her får du en helt speciel kombination til sikker desinfektion af rørsystemer. Anvendes til rengøring af rørsystemer i tomme stalde samt til desinfektion og vedligehold af rørsystemerne i stalde og sektioner med dyr. Kan med fordel tilsættes via medicinblander mindst én gang om ugen. Anvendelse bør altid stoppes minimum 2-3 døgn før vandmedicinering, tilsætning af vitaminer til vandet eller lignende. Ved tvivl kontaktes dyrlæge. Lerasept Spezial kan også anvendes som effektiv oxiderende overfladedesinfektion.

Læs mere på side 6.

Dosering uden dyr: Vandstrengen gennemskylles med rent vand. Lerasept® Spezial tilsættes rørsystemet med 1-2 % afhængig af tils mudsningsgraden. Efter mellem 30 minutter og 2 timers virkningstid gennemskylles vandstrengen med rigelige mængder rent vand.

Dosering med dyr: Tilsæt Lerasept® Spezial til rørsystemet med 0,01-0,03 %.

Vandkvaliteten påvirker blandt andet:

- malkeevne
- foderudnyttelse
- vækst
- sundhed
- dødelighed

**LERASEPT®
SPEZIAL**
HELT UNIK
FORMEL



BESTIL DEN VIGTIGE VANDANALYSE DIREKTE HOS DESTEK

- Kimal
- Mikrosvampe
- Coliforme bakterier
- Gær
- E. Coli
- Skimmelsvamp
- Enterokokker

VI SØRGER FOR:

At du modtager vandprøveflasker med tilhørende køletaske og kølelegemer, og vi instruerer dig i, hvordan prøverne udtages korrekt.

VI HAR OGSÅ SØRGET FOR:

Afhentning og transport til laboratoriet, hvor prøverne dyrkes samme dag, da det giver det mest retvisende resultat.

DU MODTAGER EN RAPPORT:

Rapporten hjælper til korrekt forståelse af analyse-svar. Hvis der er udfordringer med vandkvaliteten, assisterer vi med løsningsforslag og vejledning.

RENT DRIKKEVAND ER ALTAFGØRENDE FOR SUND VÆKST

Der er stort fokus på ernæring og foder, mens vandet ofte får for lidt opmærksomhed. Vandets kvalitet påvirker alt – lige fra foderindtag til vækst og dødelighed. Vandledningen lader dyrene komme i kontakt med hinanden og er derfor ofte det svage led.

LÆS MERE OM
VANDANALYSE



OXISAL

Et meget effektivt og oxiderende middel, som er baseret på en meget kraftig opløsning af hydrogenperoxid. Den kraftige oxidation løsriver selv de mest genstridige bio-belægninger. Virker ned til 5 °C.

Dosering uden dyr: 1–2 % afhængig af tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed.

Dosering med dyr: Tilsæt Oxisal til rørsystemet med 0,01–0,02 %.

DESTEK DOSER

Slip for tidskrævende forblanding med elektroniske Destek Doser. Kan justeres fra 0,004 % til 5 % ved et vandflow på op til 4.000 liter i timen. Maksimum kapacitet 10 liter koncentrat / time. Monteret med 1" uni-oner, nødvendige slanger og niveauføler, der sender alarm ved tom dunk, så unødigt slitage undgås.

Specielt fremstillet til dosering af blandt andet:

- Syrer
- Medicin
- Desinfektion

Leveres klar til montering med:

- Vandur
- Kontraventil
- Injektor



SPAR TID
MED
**DESTEK
DOSER**

BASIC – DEN EFFEKTIVE LINJE

Destek producerer forskellige typer af hygiejneprodukter, herunder Basic-linjen. Fælles for alle Basic-produkterne er, at de indeholder udvalgte mineraler, som udgør selve grundstammen. Det er en opskrift, der har vist sig særdeles effektiv i mere end 15 år.

VI BRUGER GRUNDSTAMMEN TIL:

- **Basic S**
Kendetegnet ved en lav pH
- **Basic Dry**
Ren udtørring
- **Basic Organic Plus**
Effektivt middel til økologi

BASIC HYGIEJNEMIDDEL – VIDENSKABELIG OG DOKUMENTERET KVALITETSHYGIEJNE

Basic Hygiejnemiddel forbedrer dyrenes nærmiljø ved at udtørre og hæmme patogene mikroorganismer. Reducerer fugt og potentielt farlige, skadelige gasser som ammoniak. Bruges regelmæssigt, så sygdomme forebygges, så det bedste miljø sikres. Basic Hygiejnemiddel er sammensat af nøje udvalgte råvarer, herunder mineraler, plantedele og desinficerende aktivstof. Forbedrer de sanitære forhold i alle former for dyrehold og staldsystemer. **Anvendelsesområde:** Benyttes til udtørring, reduktion af smittepres og øget dyrevelfærd.



Brug Basic Hygiejnemiddel regelmæssigt til at forebygge sygdomme samt sikre et bedre miljø for sunde dyr.

original

BASIC

the solution

Effektiv ammoniakbinding med god absorbering, der fungerer til alle dyrehold og staldsystemer.

DOKUMENTERET **EFFEKT** MOD:

- E. Coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Sero var 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dichelobactor Nodosus



ERFARINGER FRA STALDEN

LUNDBECHLUND I/S / 1.400 ÅRSSØER INKLUSIV SMÅGRISE TIL 30 KG

Vi mener helt klart at Basic® og FiberCombi® bidrager til at holde smittepresset nede og dyrenes omgivelser tørre, så grisene trives rigtig godt.

Vi kalker vores farestier og bruger efterfølgende Basic® under soen inden hun flyttes ind, da kalken er for hård ved søernes hud. Det fungerer rigtig fint og er skånsomt for yveret. Til pattegrisene strøer vi FiberCombi® i hulen lige før faring. Det sørger for at de tørrer hurtigt og mindsker risikoen for diarré. Videre bruger vi FiberCombi® indtil grisene er ca. 14 dage gamle og efterfølgende ved behov. Vi går en tur rundt hver dag og giver i de smågrisehjørner hvor der er begyndende fugt eller diarré. På denne måde kan vi fint holde hulerne tørre og mindsker forekomsten af diarré.

VEDØ AGRO, DJURSLAND / 1.000 ÅRSSØER

Vi kan varmt anbefale FiberCombi®

Vi bruger FiberCombi® i hulerne de første dage efter faring for at sikre tørre og rene huler. Produktet er nemt at bruge og meget drøjt i brug, hvilket betyder, at kun få huler kræver opfyldning efterfølgende. Derudover hjælper FiberCombi® effektivt med at sikre, at stierne ikke "vender" i klimastalden.

METTE NIELSEN, SØRVAD / 1.190 ÅRSSØER

Vi er meget glade for FiberCombi® og kommer ikke til at skifte i fremtiden

Vi bruger FiberCombi® i hulerne inden faring og i de første 4 dage efter. FiberCombi® tørrer både grisene og omgivelserne rigtig godt. FiberCombi® er meget alsidig, så hvor vi tidligere havde 3 arbejdsgange med forskellige produkter, har vi nu kun én. Desuden oplever vi ikke samme bøvvl med diarréer, som vi havde tidligere. Vi bruger også tørdesinfektionen Basic®, der er rigtig god til at hjælpe med at holde hygiejnen. Vores grise har Bordatella og det produkt vi brugte tidligere, havde lav pH og var hård ved dem. Så det er rart at kunne bruge et produkt der er effektivt uden at det har en lav pH.

MARIANNE, DRIFTSLEDER, NOVA LANDBRUG / 6.400 ÅRSSØER

FiberCombi® har en rigtig god udtørringsevne

Vi bruger FiberCombi® i farestalden i hulerne og op til faring også omkring yveret. Den første uge bruger vi det dagligt og gerne kombineret med tørdesinfektionen Basic®. Efterfølgende bruges de efter behov i diegivningsperioden. Vi oplever at FiberCombi® ikke støver så meget og at det giver et rart arbejdsmiljø. FiberCombi® har en rigtig god effekt ved diarréer. Det tørrer grisene godt og støtter dem.

Et banebrydende hygiejnemiddel, som virkelig forbedrer de sanitære forhold. Kan benyttes uden at flytte dyrene, og supplerer vores Basic® tørdesinfektionsmidler. Fibercombi® erstatter anden brug af udtørningsmidler, såsom kartoffelmel, træmel og strøelse.

Fibercombi® er sammensat af råvarer i højeste kvalitet, som bidrager til optimal trivsel hos smågri-sene. Er velegnet til forebyggelse af smitte samt forbedring af de sanitære forhold – i alle former for stalde og til alle dyrearter. Produktet har højeste absorptionskapacitet via den unikke sammensætning.

FIBERCOMBI

ANIMAL HEALTH AND WELFARE

- HÆMMER MIKROORGANISMER
- HÆMMER FLUELARVER
- FORBEDRER STALDMILJØET
- GOD AMMONIAKBINDING
- REDUCERER LUGTGENER
- ØKONOMISK I BRUG
- STØRRE FORTJENESTE
- KRAFTIGT UDTØRRENDE



DT ToxiTop




KOMPLEKS OG EFFEKTIV TOKSINBINDER

DT ToxiTop indeholder blandt andet:

- Hydrerede aluminiumsilikater
- Gærcellevægge
- Antioxidanter
- Krydderier og urter (fytogenika)
- Fire unikke enzymer

DT ToxiTop egenskaber:

- Forebyggelse af beskadigelse af essentielle næringsstoffer
- Forebyggelse af oxidativt stress
- Adsorption og binding af mykotoksiner
- Reduktion af immunundertrykkelse
- Genopretning af organfunktioner
- Enzymatisk biotransformation af mykotoksiner



KLINISKE SYMPTOMER MYKOTOKSINER HOS GRISE

Mulige symptomer på forgiftning A: Ikke kønsmodne / B: Kønsmodne	DON		T2 / HT2		ZEA		FB1	
	A	B	A	B	A	B	A	B
Nedsat ædelyst	X	X	X	X			X	
Nedsat tilvækst	X	X	X	X			X	
Diarré	X	X						
Opkastning	X	X						
Mave- og tarmblødning							X	
Mave- og tarmirritation	X	X					X	
Mund- og hudlæsioner			X	X				
Forringet immunitet	X	X	X	X			X	X
Fremfald af skede / endetarm					X			
Hævede mælkekirtler					X			
Hævede kønslæber					X			
Nedsat frugtbarhed		X		X		X		X
Falsk drægtighed						X		
Nyfødte grise med hævede kønslæber						X		
Små / svage kuld		X				X		X
Kastning		X		X				X
Lungeødem							X	
Lever-skade							X	
Forstørret livmoder					X	X		
Formindskede æggestokke					X			



→ Faldende daglig tilvækst.
→ Øget foderforbrug.



→ Reproduktionsproblemer.
→ Reproduktionslidelser.



→ Højere
udskiftningsbehov.



→ Sekundært: Øget
modtagelighed for
infektionssygdomme.

LÆS KILDE:
**LANDBRUG OG
FØDEVARER**



AFLATOKSINER, ZEARELENON OG DON

- Nedsat fertilitet
- Øget fosterdødelighed
- Øget antal dødfødte smågrise
- Aborter
- Vulvovaginitis / øget vulva

AFLATOKSINER, DON, T-2 OG FUMONSINER

- Tarmskader, mavesår og blødninger
- Dårlig tarmfordøjelse og absorption
- Ufordøjet foder i afføringen
- Diarré
- Reduceret villihøjde og kryptdybde
- Salmonellainfektion, enteritis / colibacillus

AFLATOKSINER, OCHRATOKSINER, DON OG T-2

- Dårlig antistofproduktion / vaccinstyrke
- Dårligere immunitet
- Ændret cytokinprofil
- Øget dødelighed

OCHRATOKSINER, CITRININ OG PENICILLINSYRE

- Nyreskade
- Urinsyrekrystaller i nyre og led (gigt)
- Øget vandforbrug

T-2 OG DON


- Reduceret foderoptag

AFLATOKSINER, OCHRATOKSINER OG FUMONSINER

- Leverskade
- Leverudvidelse
- Fedtlever

FUMONSINER OG MONILIFORMIN

- Hjerteforstørrelse
- Hjertefejl
- Lungeødem (ophobning af vand i lungerne)



DU KAN ANVENDE **DESTEK FODERSYRE** TIL AT ...

- Sænke pH-værdi i foder, vand og i grisenes maver
- Forebygge problemer med salmonella og E. Coli
- Opnå en højere tilvækst
- Opnå en bedre foderudnyttelse
- Opnå forbedret vandoptag
- Sikre mod foderrelaterede problemer
- Mindske behovet for antibiotika



destek
CARE • HEALTH • WELFARE

Alle vores Fodersyre produceres under GMP+ som sikrer høj og ensartet kvalitet.

FODERSYRE FUNKTION

	Myre-syre	Mælke-syre	Propion-syre	Eddike-syre	Benzoe-syre	Sorbin-syre	Smør-syre	Fosfor-syre	Natrium-formiat
PH SÆNKNING	++++	++	+	+	+	+	+	++++	
ANTIBAKTERIEL	+++	++++	+	+	+++	++++	++++		
ANTIFUNGI			++++	+	+++	++++			
ANTIGÆR		(-)	+++	++++	+++	++++			
ENERGI		++	+++	+			+++		
ENZYM SEKRETION	++	+++					+		
VILLISUNDHED		++					++++		++++

FODERSYRE STANDARDPROGRAM

	Myre-syre	Mælke-syre	Propion-syre	Eddike-syre	Benzoe-syre	Sorbin-syre	Fedt-syre	Natrium-formiat	HACCP-fri
MYRESYRE	X								
PROPIONSYRE			X						
FARMACID®	X								X
FARMACID® MP	X		X						X
FARMACID® MP 80/20	X		X						X
FARMACID® MMP	X	X	X			X			X
FARMACID® MPE+	X		X	X		X		X	X
FARMACID® MPS	X		X			X			X
FARMACID® PH	X		X	X	X			X	X
FARMACID® VITALY	X		X				X	X	X
FERMENTACID	X		X	X		X			X

VÆRD AT VIDE

Bakterier bruger de letoptagelige næringsstoffer som aminosyrer. I svære tilfælde kan dette medføre et energitab af foderet på op til 40 %. Gær bruger de letoptagelige næringsstoffer til at danne ethanol og CO₂, og kan også omdanne mælkesyre til ethanol.

Skimmelsvampe vokser primært i iltholdige miljøer og danner toksiner, der kan være meget giftige. Særligt i vådfoder kan der forekomme store svampe- og gærdannelser. En ren myresyre vil primært sænke og stabilisere pH værdien, samt virke antibakteriel. Propionsyre vil reducere dannelsen af svampe og gær.

ENERGI: Mælkesyre og Propionsyre hjælper til bedre energiudnyttelse af foderet.

ENZYMSEKRETION: Mælkesyre og myresyre forbedrer enzymudskillelsen i tarmsystemet, så dyret derved øger foderudnyttelsen.

VILLISUNDHED: Mælkesyre forbedrer den generelle tarmsundhed.

FERMENTERING I VÅDFODER BØR BEGRÆNSES!

- Fermentering forbruger aminosyrer, vitaminer og energi.
- Fermentering kan danne syrer og andre stoffer, der giver foderet dårlig smag.

FERMENTERING KAN VÆRE MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL:

- Dårlig mælkeydelse hos søer.
- Dårlig foderudnyttelse hos smågrise og slagtegrise.
- Lav kødprocent.
- Generelle sundhedsproblemer.

DT FARMACID® MPE+

FLYDENDE TILSKUDSFODER

*Kompleks blanding med symbiotisk effekt, der beskytter mod tab af aminosyrer.
Holder grisefoderet friskt og forbedrer foderudnyttelsen.*

- Flydende tilskudsfoder – baseret på blanding af organiske syrer.
- Hovedvægt på formiater, myresyre, propionsyre, eddikesyre og sorbinsyre.
- Stærkt konserverende over for gær og skimmel, hvilket sikrer kvaliteten af vådfoder.
- Velegnet til støddosering ved overgæring af vådfoder.



**DT
FARMACID®
MPE+**

**OPTIMAL
KONSERVERING
AF GRISENE
VÅDFODER**


CARE • HEALTH • WELFARE

*Hold grisefoderet sundt og friskt
– og optimér grisenes foderudnyttelse.*

DESTEK TILSKUDSFODER



DT FARMACID® VITALY

FLYDENDE TILSKUDSFODER

Kan tilsættes drikkevandet til de fravænnede grise i klimastalden, og er især relevant i de første uger efter fravænning.

- Indeholder forskellige mellemkædede fedtsyrer, der understøtter tarmfunktionen.
- Understøtter grisens egen syreproduktion, som ofte er underpræsterende de første uger.
- Arbejder langt ud i tarmen og hæmmer væksten af patogene mikroorganismer: coli, clostridium og salmonella.

Vi anbefaler, at køre rørdesinfektion før og efter brug af DT FarmAcid Vitaly, da produktet kan give biofilm ved lave doseringer.




DEN BEDSTE
OPSTART TIL
FRAVÆNNINGS-
GRISE

DT
FARMACID®
VITALY



FRAVÆNNING AF SMÅGRISE

Grisenes pH i maven bør være **3,5 for optimal fordøjelse og sundhed**. Under diegivning kontrollerer mælkesyren fra mælken pH'en. Efter fravænning skal grisen selv udvikle produktionen af saltsyre, og det kan tage mere end **fire uger** efter fravænning, før denne er fuldt udviklet.



"Team Destek er langt mere end bare salg! Vi brænder også for den solide rådgivning"



"Tag kontakt – vi er klar til at hjælpe dig godt videre"



DESTEK APS

Tåstrupvej 7

DK- 4370 Store Merløse

Ring til **+45 3313 1125**

Skriv til **info@destek.dk**

ÅBNINGSTIDER

Man – tors **08.00 – 16.00**

Fre **08.00 – 15.30**

LÆS MERE PÅ
DESTEK.DK

