

# FIBERCOMBI

ANIMAL HEALTH AND WELFARE



## Einzigartiges Stallhygienemittel

**Fibercombi®** ist ein einzigartiges milieuverbesserndes Stallhygienemittel, dass aus verschiedenen besonders ausgewählten Rohmaterialien besteht. Jedes Material für sich trägt zu einer optimalen Entwicklung und Gesundheit der Tiere bei.

**Fibercombi®** kann desinfizierende Einstreumittel wie z.B. Basic® ergänzen und völlig den Gebrauch von anderen Stallhygienemitteln, wie Kartoffelstärke und Einstreu ersetzen. Somit eignet sich **Fibercombi®** dazu Infektionen vorzubeugen und die sanitären Verhältnisse in allen Ställen und für alle Tierarten zu verbessern.

**Fibercombi®** hat auf Grund seiner komplexen Zusammensetzung eine enorm hohe Absorptionskapazität.

**Fibercombi®** wird primär auf den Liegeflächen der Tiere eingesetzt. Die enorme Absorptionskapazität von **Fibercombi®** schafft eine trockene Umgebung und trägt so dazu bei, die Lebensbedingungen für schädliche Mikroorganismen und Fliegenlarven zu eliminieren.

### **Fibercombi® Verpackung:**

20 kg Plastiksack  
1.000 kg Bigbag

### **Fibercombi® Lagerung:**

Trocken, außerhalb von Sonnenlicht.  
Verpackung nach Gebrauch schließen.



- Hemmt das Schlüpfen von Fliegenlarven und anderen Insekten
- Hemmt das Wachstum von schädlichen Bakterien
- Verbessert das Stallmilieu
- Einfach in der Anwendung
- Enorm hohe Absorptionskapazität, kräftig austrocknend
- Gute Bindung von Ammoniak
- Reduziert den Geruch von Ammoniak
- Wirtschaftlich in der Anwendung
- Größerer Verdienst

[www.destek.dk](http://www.destek.dk)

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tel.:

Mail:

+45 3313 1125

[info@destek.dk](mailto:info@destek.dk)





## Gebrauchsanweisung

**Fibercombi®** wird wie traditionelle Stallhygienemittel ohne Umstallen der Tiere verwendet und kann manuell oder mit einer Maschine ausgestreut werden. FiberCombi® kann als Fertigstreu eingesetzt werden, kann aber auch mit anderer Streu vor der Zuteilung vermischt werden.

Unter normalen Bedingungen wird **Fibercombi®** 2-3 Mal pro Woche ausgestreut. Die Menge sollte jedoch dem jeweiligen Stallmilieu angepasst werden. Bei belastetem Stallmilieu sollte **Fibercombi®** täglich eingesetzt werden.

**Fibercombi®** wird generell mit 50 g (eine Hand voll) pro m<sup>2</sup> dosiert. Bei Beginn wird flächendeckend, entsprechend ca. 50 g pro m<sup>2</sup>, dort eingestreut, wo man einen trockenen Bereich wünscht. Nachfolgend wird feuchtes Material entfernt und mit neuem ersetzt.

- **Hemmt das Schlüpfen von Fliegenlarven und anderen Insekten**
- **Hemmt das Wachstum von schädlichen Bakterien**
- **Verbessert das Stallmilieu**
- **Einfach in der Anwendung**
- **Enorm hohe Absorptionskapazität, kräftig austrocknend**
- **Gute Bindung von Ammoniak**
- **Reduziert den Geruch von Ammoniak**
- **Wirtschaftlich in der Anwendung**
- **Größerer Verdienst**

### Legehennen

**Fibercombi®** wird flächendeckend in den Nestern und an feuchten Stellen auf dem Stallboden ausgestreut. Nach dem Einstellen einer neuen Gruppe, sollte **Fibercombi®** die ersten 4 Tage täglich, und danach regelmäßig 2-3 Mal wöchentlich verwendet werden. Bei konsequentem Gebrauch von **Fibercombi®** mindestens 2-3 Mal wöchentlich, wird ein trockenes Milieu gesichert, Ammoniak wird gebunden und Feuchtigkeit absorbiert. Dadurch wird verhindert, dass die Einstreu zu feucht wird, da eine feuchte Einstreu zur Ammoniakbildung führen kann, die wiederum Ätzungen und Beschädigungen der Fußballen hervorrufen kann.

### Masthähnchen

Nachdem der Stall geleert und gründlich gereinigt worden ist, kann **Fibercombi®** vorteilhaft flächendeckend im leeren Stall verteilt werden. Danach wird die gewöhnliche Einstreu, wie z.B. Stroh oder Hobelspäne verteilt, um danach nochmals **Fibercombi®** auf der gewöhnlichen Einstreu auszustreuen. Nach dem Einstellen der neuen Hähnchen wird **Fibercombi®** 2-3 Mal wöchentlich bis zur Schlachtung verwendet.

Bei Problemen oder erhöhtem Krankheitsdruck, oder unter besonders feuchten Verhältnissen im Stall, sollte **Fibercombi®** täglich mit einer Dosierung von 75-100g pro m<sup>2</sup> Bodenfläche verteilt werden, bis die Umstände sich wieder normalisiert haben.